


AGD í Føroyum

Aliráðstevnan 2019

Kirstin Eliassen







2013



[Áki Bertholdsen](#) 05.11.2013 (18:36)

Amøba staðfest í fyra alibrúkum

Nú er staðfest, at amøban, við latínska navninum Paramoeba perurans, sum kann elva til fiskasjúkuna AGD, er í fyra alibrúkum í Føroyum.

Nú er staðfest, at amøban, við latínska navninum Paramoeba perurans, sum kann elva til fiskasjúkuna AGD, er í fyra alibrúkum í Føroyum.

Tað sigur Heilsuføðiliga Starvsstovan.

Tey fyra alibrúkini, Amøban er staðfest, eru tey í Fuglafirði, í Miðvági, í Lambavík og Oyndarfirði.

- Vit kunnu enn ikki siga um amøban hevur eitt til AGD, ella um hon bara er til staðar.

Heilsuføðiliga Starvsstovan sigur, at dømi eru um, at Paramoeba perurans er til staðar uttan at geva sjúku.

- Fyri at staðfesta um vit hava sjúkuna, eru tákusýni send til kanningar í Noregi.

- Í Fuglafirði og Miðvági vóru tey frammanundan í holt við at slakta fiskin, so her verða alibrúkini tømd fyri fisk.

- Í Lambavík og í Oyndarfirði er fiskurin ikki tøkuklárur. Tó eigur dentur at verða lagdur á, at Amøban, á hesum støðum bert er ávíst í einum sýni av 40.

2018

TEMA
Alivinna

22.12.2018 - 12:44

Sjúka kostar Luna 25 milliónir

Sjúkan AGD, sum hevur rakt alibrúk hjá Luna í Miðvági, kostar væntandi fyrítøkuni 25 milliónir krónur, sigur Atli Gregersen, stjóri

[Rólandt Waag Dam](#)



👍 Dátta 0 Deil


Tak niður

Sambært stjóranum á Luna hevur sjúkan verið í Føroyum í nøkur ár, men at hon skuldi raka so meint júst nú, kom óvæntað á tey.

Fellið er stórt og nú taka tey fiskin og eru farin undir at gera fyrirbyggjandi tiltøk.


Í tonsum verður talan helst um eitt felli upp á 500 tons.

Óvanliga heit ár



AGD (Amoebic Gill Disease)

Neoparamoeba perurans





Penar táknur

Sjúkar táknur



Atburður:

- Verður dølskur
- Missir matarlystin
- Savnast í vatnskorpuni
- Andar títtari



Eyðmerking av AGD

AGD (Amoebic Gill Disease) eru amøbur (skaploysingar), ið festa seg á táknur, og harvið minka um iltupptøkuna hjá smittaða fiskinum. Hvussu illa fongdar táknurnar á fiskinum eru, kann býast upp í seks stig (0-5). Har táknuruttan sjónlig tekin um amøbur fáa metingina **stig 0**. **Stig 1** táknur sýna fyrstu tekin um smittuna. Á **stig 2** táknur hava amøburnar veruliga fest seg, og økini eru vorðin størri og fleiri. Á **stig 3** táknur byrja amøburnar at spjæða seg tvørtur um allan táknubogan. Á **stig 4** táknur hava amøburnar spjætt seg um allan táknubogan, og fjala upp til 50% av táknunum. **Stig 5** táknur eru mestsum undir í amøbum. Vanligt er, at fyrstu teknini uppá AGD (stig 1 og 2) eru at finna nær við táknubogafestið. Týðningarmikið er tí at kanna hesi økir væl. Hóast hetta kunnu tað vera aðrir táknubogar, ið fyrst verða verri fongdir (stig 3-5). Hvussu illa fongdar táknurnar eru, verður mettt út frá ringast fongda táknuboganum. Reytt doyvingarvatn (blóð), kann vera ábending um AGD.







Fig. 3. Relationship between gross gill score as determined by salmon farmers and PCR results for gill swabs.


Bridle et al. 2010

Eyðmerking

Stig 1




Stig 2



Eyðmerking

Stig 3*



Stig 4*





Stig 5*




*Verður frámælt at viðgera við H_2O_2

Føroyar




Føroyar



Fyrivarni

- Fiskatættleiki
- Skifta nót
- Ikki bíða ov leingi áðrenn viðgerð
- Brakklegging





Takk fyri at tit lýddu á 😊